

Descriptions de Coléoptères d'Asie et de Malaisie

PAR L. FAIRMAIRE.

Dicheloplia fuscopicta n. sp. — Long. 7 mill. — *Ovata, crassa, subtus valde convexa, fusca, opacula, dense breviter pilosula, prothorace dense rufo-fulvo-pilosulo et vitta media paulo dilutiore, dorso vittis 2 paulo incompletis, fuscis, scutello fusco, nitidissimo, elytris vitta suturali integra et utrinque vittulis 4 rufo-fulvis, 1^a integra, antice cum 2^a, 2^a cum 3^a apice conjunctis, 4^a brevissima, medio abbreviata; capite rugoso-punctato, clypeo antice truncato et paulo reflexo; prothorace vir transverso, elytris haud angustiore, lateribus rotundato, antice angustiore, margine postico utrinque vir sensim sinuato, angulis obtusis; scutello sat magno, obtuso, polito, ante apicem transversim impresso; elytris breviter ocatis, ad humeros sat rotundatis, medio ampliatis, a medio postice angustatis, apice conjunctim rotundatis, dorso densissime subtiliter coriaceis, vittis fuscis fere denudatis, margine laterali late denudato; subtus cum pygidio dense fulvo-pilosis, pilis adpressis, pedibus rufo-piceis, similiter pilosis, tibiis anticis bidentatis, dente apicali majore et dicaricato, pedibus posticis majoribus, paulo compressis.*

Haut Tonkin : Bin-Lu près Laokaï.

Ressemble beaucoup à *B. crassa* Sharp, mais les bandes claires sont plus jaunes, les brunes plus foncées, l'écusson est nu, brillant, avec une impression transversale, les angles postérieurs du corselet sont obtus, les élytres sont un peu plus courtes, avec la bordure marginale dénudée et les pattes postérieures, surtout les tibias, sont bien moins épaisses, comprimées, et la tête est plus rebordée.

Blabephorus n. g.

Genre voisin des *Cyphonistes* par ses mandibules saillantes et tridentées, les organes de stridulation occupant le milieu du propygidium, formés de très fines aspérités serrées; mais les tibias antérieurs quadridentés, les crochets tarsiens antérieurs égaux, la tête simplement tuberculée au milieu, le corselet sans saillies ni carènes mais ayant une impression assez large et médiocrement forte, occupant à peu près toute la longueur du disque, le distinguent suffisamment; les pattes sont assez robustes, les tibias antérieurs ont bien 4 dents, mais la supé-

rière est beaucoup plus petite, les autres sont fortes et aiguës, l'épéron apical interne est très robuste; les crochets des tarses sont assez grêles, le dernier article n'est pas renflé, ce qui me fait croire que les insectes dont je parle sont des ♀. La saillie postcoxale du prosternum est assez forte, les tibias postérieurs sont tronqués et fortement digités.

B. pinguis n. sp. — Long. 22 à 27 mill. — *Oratulus, latus, convexus, piceus, nitidus; capite ante oculos constricto, antice angustato, transversim dense strigoso, clypeo antice obtuse rotundato et leviter reflexo, fronte medio tuberculo brevi conico signata; prothorace transverso, elytris haud angustiore, antice a medio fortiter rotundato-angustato, sat fortiter dense punctato, medio oblonge impresso, ruguloso-punctato et fundo fere sulcato, basi sat tenuiter marginato et ante angulos paulo sinuato, his obtuse rotundatis, antice marginato, medio latius, angulis obtusis; scutello obtuse ogivali, rugosulo punctato; elytris amplis, ad humeros sat rotundatis, dorso rugosulis, sat grosse punctatis, intercallis subtiliter punctulatis, linea suturali basi grossius punctata et paulo impressa, postice obsoleta, utrinque lineis geminatis 3 vage indicatis; pygidio subtilissime dense coriaceo; subtus cum pedibus castaneus, nitidus, laevis, sed medio rufo-pilosulus, pectoris lateribus subtilissime dense coriaceis, minus nitidis, femoribus latis, compressiusculis, metatarsis supra dente valido acuto armatis, unguiculis omnibus sat minutis.*

Sumatra : Labouan. — Ma collection.

Phoeochroops silphoides n. sp. — Long. 6 mill. — *Oratus, postice ampliatus, convexus, fuscus, nitidulus, pilis brevibus fulvidis laevissimus; capite grosse ac dense punctato, apicem versus parum attenuato, apice fere truncato, labro magno, piceo, rude punctato, palpis antennisque piceo-rufis; prothorace elytris paulo angustiore, antice a basi attenuato, dense ac grosse punctato, margine postico levissime bisinuato; scutello angusto, sulcatulo; elytris oratis, postice ampliatis, sutura et utrinque costis 3 elevatis, interstitiis subtiliter densissime punctulato-coriaceis; subtus cum pedibus piceus.*

Sumatra. — Ma collection.

Ce genre ne renferme encore qu'une seule espèce, *P. Langsbergei* Cand., beaucoup plus grande, à tête plus longue, le chaperon séparé par une petite carène transversale, à villosité longue, plus serrée, notamment sur les côtés; le bord postérieur du corselet est un peu marginé devant l'écusson avec les angles plus marqués, les élytres sont plus amples avec la sculpture des interstices plus fortement ponctuée et les côtes moins saillantes, l'externe peu distincte.

Anomala pilosella n. sp. — Long. 14 à 15 mill. — Forme et sculpture de *Faulax*, mais plus grande, entièrement bronzée, peu brillante, couverte d'une villosité roussâtre très courte, fine, plus serrée sur le corselet et la tête, plus longue sur le dessous du corps qui a des teintes un peu vert-bronzées, surtout aux pattes; la tête est plus étroite, plus finement ponctuée; les antennes sont roussâtres avec la massue brune; le corselet est plus étroit, plus rétréci en avant, plus finement ponctué, sans sillon médian; l'écusson est plus obtus; les élytres ont des côtes plus larges, moins saillantes, la ponctuation est plus fine, les stries sont plus marquées; le pygidium est couvert d'une villosité courte, serrée, et n'a pas une fossette de chaque côté à la base; le dessous du corps est un peu plus ponctué.

Thibet : Siao-Lou. — Coll. Oberthür et la mienne.

Trionychus assamensis n. sp. — Long. 24 mill. — *Oblongus, supra planiusculus, fusco-niger, nitidus; capite antice angustato, inter oculos transversim concavo et laevi, antice lateribus marginato et medio obtuse breviter anguloso, ante oculos breviter sed sat acute angulato, fronte cornu modico vix arcuato armato, mandibulis antice acute lobatis; prothorace transverso, basi elytris angustiore, medio dilatato, lateribus rotundatis, basi vix rectis, angulis posticis acutiusculis, dorso tenuiter laevè punctato, lateribus fortius ac densius, antice forca sat profunda, medium dorsi postice attingente, fere rotunda, parum fortiter marginata; margine postico medio sinuato et utrinque obtuse angulato; scutello ogivali, laevi; elytris oratis, basi truncatis, ad humeros angulatis, dorso sat fortiter confuse punctatis, sutura paulo elevata, laevi, utrinque lineis 4 geminatis, pygidio fortiter convexo, basi laevè punctato; pectore et femoribus subtili rufa pilosis, pedibus validis, tibiis anticis erctis acute tridentatis.*

Assam. — Ma collection.

Diffère du *chinensis* par son corps déprimé, son corselet rétréci également aux deux extrémités, à angles postérieurs très ponctués et l'impression antérieure presque ronde, avec le bord postérieur sinué et deux saillies obtuses.

Trionychus Poteli n. sp. — Long. 21 mill. — Ressemble au précédent, mais plus petit, plus convexe, le corselet à angles postérieurs très obtus, les antérieurs plus courts, plus déclives, la cavité antérieure plus grande, plus fortement rebordée, le bord postérieur plus rapproché de la base, fortement arqué, avec une très faible dépression au milieu et le fond grossièrement ponctué; les élytres ont une ponc-

tuation plus grosse et plus régulière, un peu sériale, les intervalles formant presque de faibles côtes comme ceux des lignes géminées, les tibias antérieurs sont armés de même ♂.

Tientsin (ma collection) ; un autre individu également ♂ trouvé au Kiangsi par M. Potel, lazariste, et communiqué par M. l'abbé David.

Le *Phileurus chinensis* Fald., qui se trouve en Mongolie et au Japon, doit rentrer dans le genre *Trionychus* à raison de la conformation du menton et des tarses antérieurs ♂. Il en est de même du *P. morio* Fald., de la même région.

Je n'ose pas séparer de cette espèce un individu de l'île Oshima qui est un peu plus grand, plus allongé, avec la fossette du corselet plus petite, plus arrondie, les côtés du corselet plus ponctués et la sculpture des élytres plus irrégulière, la corne céphalique plus épaisse et le chaperon plus fortement arrondi au bord antérieur.

Cosmiomorpha angulosa n. sp. — Long. 21 à 24 mill. — Ressemble extrêmement à la *modesta* W. pour la forme, la taille et la coloration, en diffère par la tête dont la carène médiane est plus saillante et s'arrête brusquement, le bord antérieur du chaperon moins relevé, sinué en angle obtus et formant deux angles dont les côtés externes sont à peine obliques : le corselet a les côtés plus parallèles en arrière, plus sinués et plus relevés, formant au milieu un angle très marqué, plus ou moins saillant : l'écusson et les élytres sont semblables, la suture est également lisse, saillante et foncée ; les pattes sont d'un brun rougeâtre plus foncé avec les tarses plus rougeâtres et souvent les tibias. Les ♀ ont les pattes plus courtes, les tibias antérieurs larges, rugueux, tridentés, et l'extrémité des élytres est assez fortement échancrée près de l'angle sutural.

Thibet : Siao-Lou. — Coll. Oberthür et la mienne.

Bietia n. g.

Ce nouveau genre me paraît rentrer dans le groupe des *Ischnostomides*. Les antennes diffèrent peu entre les sexes, cependant la massue est plus grande chez les ♂ ; le dernier article est concave et semble une coquille enveloppant les deux autres. La tête est assez petite, tronquée en avant avec les angles arrondis, les palpes sont épais avec le dernier article ovalaire, arrondi à l'extrémité. Le corselet est transversal, plus étroit que les élytres, rétréci en avant ; la base est presque droite de chaque côté, sinuée devant l'écusson. Celui-ci assez long, triangulaire, acuminé. Les élytres sont presque carrées, brusquement arrondies à

l'extrémité. Le pygidium est assez grand, le propygidium découvert en partie. Le prosternum est assez étroit et s'élève verticalement entre les hanches antérieures, la saillie métasternale est assez large, très obtuse, le mésosternum presque vertical, caché par les longs poils qui couvrent la poitrine. Les pattes sont assez robustes, les tibiaux antérieurs à peine bidentés chez les ♂, larges et fortement tridentés chez les ♀, les tarses sont assez longs et assez forts.

Ces insectes ont une certaine analogie avec les *Ischnostoma* par leur forme.

B. rudicollis n. sp. — Long. 14 à 15 mill. — *Brevis, crassa, nigra, sat nitida, supra parce, subtus dense longe griseo-villosa; capite subtiliter punctato, antice truncato, angulis rotundatis, marginibus elevatis, antennis fusco-piceis, articulo 1^o crasse clavato, 2^o sat globoso, 3^o rix minore, sequentibus brevibus, clava sat compacta, trilamellata, ♀ stipite brevior.* ♂ fere longiore, leviter arcuata, lamella externa concava; prothorace transverso, elytris parum angustiore, a basi antice angustato, dorso inaequali, dense sat fortiter punctato-ruguloso, margine postico medio recto, utrinque parum obliquo, angulis rotundatis; scutello acuto, ruguloso-punctato; elytris quadratis, apice abrupte truncatis, rugoso-punctatis, sutura et utrinque costulis pluribus modice converis, alternatim magis distinctis, humeris converis, laevibus, margine externo basi leviter sinuato; pygidio lato, subtiliter dense asperulo; subtus cum pedibus nitidior, abdomine medio ♂ dense breviter griseo-villoso, ♀ nudo.

B. simillima n. sp. — Long. 15 à 18 mill. — *Præcedenti valde similis, sed capite dense asperato, margine antico medio leviter sinuato, palpis et antennis (articulo 1^o excepto) ferrugineis; prothorace minus brevi, a medio tantum angustato, dorso multo subtilius punctato, margine postico ad scutellum leviter sinuato, angulis fere rectis; elytris minus brevibus, sutura et costis latioribus, magis regularibus, intercallis subtilius rugosis, densius pilosis, humeris longius elevatis; subtus minus villosus.* ♂ Minor, antennarum clava magna, abdomine medio basi pubescente. ♀ Major, magis compacta, clava brevior, abdomine glabro, nitidissimo.

Ces deux espèces viennent de Se-Pin-Lou-Chan (Thibet), où elles ont été recueillies par M^{re} Biet.

Cetonia exasperata n. sp. — Long. 17 à 21 mill. — *Orata, sat crassa, viridi-aenescens, nitida, plus minuscule interdum cuprascens, antennis piceis; capite prothoraceque fortiter rugoso-punctatis, illo antice*

attenuato, clypeo minus punctato, apice sinuato, lobis lateralibus obtusis, paulo reflexis, antennis rufo-piceis; prothorace elytris parum angustiore, antice arcuatim angustato, medio linea polita, ad scutellum dilatata signato, dorso basi utrinque impressione transversim orata parum profunde signato, margine postico ad scutellum sinuato, angulis rotundatis; scutello polito, apice obtuso; elytris oratulo-quadratis, fortiter sat dense punctatis, sutura et utrinque costulis 2 elevatis, interstitiis medio paulo depressis et carioso-punctatis, parte laterali rugosa et longitudinaliter plus minusve impressa, dorso utrinque signaturis albo-pubescentibus minutis, 2 transversis prope suturam et aliquot aliis ab humero ad apicem et puncto apicali plus minusve evidentibus signatis, angulo suturali fere obtuso; pygidio fortiter dense strigoso-punctato; subtus laevis, pectore et femoribus cum tibiis dense fulco-pilosis, abdomine varius punctato, pedibus mediocribus, tibiis rugosis, anticis parum fortiter dentatis, intermediis fere medio fortiter angulatis, dein fere emarginatis.

Archipel Liou-Kiou : Oshima. — Coll. Oberthür et la mienne.

Cet insecte est remarquable par sa ponctuation rugueuse, son chaperon presque bilobé, ses très petites taches blanches, la saillie mésosternale est étranglée à la base, large et presque tronquée à l'extrémité; son faciès est un peu celui de la *C. Karelinei*.

Poecilnота cupraria n. sp. — Long. 15 mill. — Forme des *P. Davidis* et *ringata*, mais d'une coloration foncière différente, d'un beau cuivreux un peu foncé en dessus avec la suture d'un noir métallique à reflets dorés, la tête d'un vert métallique brillant mélangé de cuivreux et de doré, le corselet ayant sur le disque 2 larges bandes et les élytres ayant de chaque côté 3 grandes taches d'un noir bleu, la 1^{re} discoïdale avant le milieu, les 2^e et 3^e en travers à peine après le milieu, la 4^e aux 3/4, s'étalant sur le bord externe, la 5^e apicale formée de quelques petites taches confluentes, plus quelques petites taches à la base, à l'épaule et vers la suture, épipleures d'un vert métallique comme les pattes, dessous du corps d'un doré cuivreux éclatant; tête rugueusement ponctuée, avec un petit relief lisse entre les yeux, antennes d'un vert bleuâtre métallique; corselet très densément et rugueusement ponctué, ce qui le rend moins brillant ainsi que les élytres, de chaque côté vers la base une impression oblique, écusson fortement creusé au milieu; élytres très densément et finement rugueuses, un peu mates, mais brillantes à la suture, les 3 premières stries bien marquées, les autres moins nettes, la suture étroitement verdâtre ainsi que l'extrémité des élytres qui est tridentée, les côtés plus finement

denticulés : dessous du corps assez finement et ruguleusement ponctué, dernier segment ventral tridenté et sinué entre les dents, bord apical des segments étroitement verdâtre.

Haut-Tonkin : Bin-Lu près Laokai.

Lichas subocellata n. sp. — Long. 26 à 28 mill. — Forme et coloration générale du *funebris*, de Chine, mais un peu plus grand et plus allongé : le corselet est plus large, pas plus étroit à la base que les élytres, plus rapidement rétréci en avant, les côtés presque droits, à peine arqués tout à fait à la base, les fossettes discoïdales sont plus profondes : les élytres sont plus longues, les stries sont bien marquées, assez fortement ponctuées, la suturale est dénudée, mais c'est peut-être accidentel, les côtés sont ornés de grandes taches en forme d'anneaux plus ou moins réguliers, dessinés par la pubescence cendrée qui couvre aussi l'extrême base, la marge latérale est irrégulièrement ponctuée et ruguleuse, l'extrémité est assez brusquement arrondie : le corselet a des bandes peu régulières, interrompues, formées par la même pubescence qui couvre tout le dessous du corps et les pattes, sauf le dernier article des tarses ; l'abdomen a, sur les côtés, de petits tubercules lisses.

Kina-Balu (*Staudinger*).

Le dessin des élytres est un peu variable et forme parfois de courtes bandes entre les anneaux, qui sont plus ou moins ocellés.

Lichas fasciolata n. sp. — Long. 49 mill. — Ressemble à la variété du précédent, mais beaucoup plus petit, d'une coloration plus châtain ; la forme est plus elliptique, plus convexe, la tête est moins courte en avant et un peu impressionnée, le chaperon plus nettement tronqué, les antennes bien plus étroites, plus courtes ; le corselet est plus convexe, plus étroit, moins rétréci en avant, les côtés à peine arqués, le bord postérieur moins lobé au milieu ; les élytres sont striées de la même façon, avec des bandes transversales formées par des taches oblongues dénudées ; la saillie prosternale est moins acuminée.

Kina-Balu (*Staudinger*).

Lichas Baeri n. sp. — Long. 48 mill. — Forme un peu plus étroite, plus atténuée aux deux extrémités, corps plus convexe, d'un roux cannelle, avec les mêmes fascies transversales de taches dénudées sur les élytres ; la tête est finement sillonnée, le chaperon faiblement sinué, les antennes courtes, bien en scie ; le corselet est plus large à

la base qui embrasse celle des élytres ; celles-ci ont la même sculpture et sont plus atténuées en arrière.

Luzon : donné jadis par Dohrn.

Le nom de cet insecte, dont le genre n'a pas été signalé aux Philippines, rappellera celui de l'excellent collègue à qui nous devons le Catalogue des Coléoptères de cette région.

Laius Baeri n. sp. — Long. 3 mill. — *Ovatus, postice leviter ampliatus, sat converus, fusco-coeruleus, sat nitidus, hirtulus, elytris utrinque macula transversim triangulari ante medium extus latiore, et ante apicem macula ovata paulo transversali; capite laevi, antice transversim impressiusculo, antennis crassiusculis, 3° articulo 3° inflato, auriculato, aurantiaco, 2° articulis 2 primis paulo crassioribus, concoloribus; prothorace longitudine haud latiore, elytris valde angustiore, basin versus leviter angustato et transversim profunde impresso; elytris ovatis, ad humeros angulatis, postice ampliatis, paulo rugulosis, sat grosse, parce punctatis; pedibus sat gracilibus, simplicibus.*

Iles Philippines. — Ma collection.

Ressemble un peu au *L. fasciatus* Fairm., du Tonkin, mais plus petit, avec la bande transversale coupée en deux parties et deux taches antéapicales blanches.

Botiras oblongulus. — Long. 12 mill. — Ressemble au *B. striatulus* Fairm., de Kashmir, mais plus grand, plus oblong, les élytres ovalaires-oblongues, pas plus larges à la base que le corselet, un peu plus larges au milieu, plus ruguleuses, plus ponctuées, non striées, sauf la strie suturale qui est bien marquée au milieu, sur le disque 2 lignes faiblement saillantes et une autre plus marquée sur le bord externe; le corselet est moins large, moins finement ponctué, ses angles sont plus obtus; la tête présente en avant une impression large, peu profonde, les antennes sont plus minces, les articles plus étroits; l'écusson n'est pas visible; le dessous du corps, avec les épipleures et les pattes, est de couleur marron, et les segments ventraux sont plans au lieu d'être un peu convexes; enfin les tarses antérieurs et intermédiaires ont les 2° et 3° articles très élargis, le 4° un peu sinue à l'extrémité.

Inde boréale. — Musée de Genève et ma collection.

Crypticoides n. g.

Ce nouveau genre a de grands rapports avec les *Hegeter* dont il diffère par le chaperon ayant en avant une très petite dent comme les

Rhytinota, une strie carénée le long des yeux, les antennes plus épaisses, à 3^e article de moitié plus long que le 2^e, le 41^e à peine plus étroit que le pénultième, le mésosternum oblong, concave, et les élytres à épipleures très larges, rappelant assez celles des *Zophosis*. Le dernier article des palpes maxillaires est assez oblong, tronqué, nullement sécuriforme. Les yeux sont réniformes, le corselet est trapézoïdal, avec les angles antérieurs saillants, le bord postérieur est largement sinué de chaque côté avec les angles assez aigus, les antérieurs sont très saillants. L'écusson n'est pas visible. Les élytres sont très rétrécies en arrière, sans stries. La saillie intercoxale est comme celle des *Hegeter*, le 4^e segment ventral est très court. Les pattes sont plus grêles.

Le faciès de cet insecte est celui d'un *Zophosis*.

C. Mellyi n. sp. — Long. 8 1 2 mill. — *Oblongo-oratus*, fere ellipticus, postice magis attenuatus, convexus, niger, modice nitidus, subtus cum pedibus paulo picescens et nitidior; capite fere indistincte punctulato, ad oculos plicatulo et intus striato, clypeo medio obtuso et dente minuto, reclinato signato, antennis subcrassiusculis, fere cylindricis, articulo 3^o longiore, 4^o precedente parum brevior, 8-10 paulo brevioribus, ultimo angustiore, paulo acuminato; prothorace trapeziformi, basin elytrorum fere amplexante, angulis posticis latis, paulo acutis, anticis acute productis, dorso larvi; scutello nullo; elytris laevibus, basi tenuiter marginatis, ante medium postice attenuatis, apice sat acuminatis, epipleuris latis, planis, integris; prosterno modice lato, medio leviter sulcato, mesosterno horizontali, late sulcato, antice truncato; subtus fere laevis, pedibus sat gracilibus.

Thibet. — Coll. Melly. Musée de Genève, et ma collection.

Pseudoblaps Oedipus n. sp. — Long. 21 mill. — *Oblongo-elongata*, sat convexa, nigra, modice nitida; capite subtiliter coriaceo-punctulato, subquadrato, antice late sinuato, angulis sat rotundatis, antennis parum gracilibus, prothoracis basin vix superantibus, articulo 3^o sequenti paulo longiore, ceteris ovatis, ultimo subgloboso, palpis maxillaribus articulo ultimo valde transverso; prothorace sat transverso, elytris haud angustiore, antice et postice fere aequaliter angustato, lateribus rotundato, dorso densissime subtiliter punctulato, basi fere recta, subtiliter marginata, ante angulos sinuata, his paulo retrorsis, sat acutis; elytris oblongis, ad humeros valde angulatis, fere parallelis, fortiter striatis, intervallis convexis, utrinque cum striis plicatulis, externis magis elevatis; subtus dense subtiliter coriacea, abdomine segmentis 2 primis medio late impresso, ultimo apice rotundato, pedibus validis,

tibiis anticis angulatim extus arcuatis, intus apice dilatatis, intermediis apicem versus latioribus, posticis leviter arcuatis, intus dense pilosis, tarsis omnibus latis, anticis latioribus.

Inde. — Musée de Genève: ma collection.

Forme du *nigrita*, mais plus grand, les sillons des élytres bien plus fortement crénelés, le corselet plus large, plus arrondi sur les côtés, les tibiais plus fortement arqués, les tarses plus larges.

Pseudoblaps ampliata n. sp. — Long. 48 mill. — *Oblonga, postice ampliata, fusco-nigra, opaca, nervulis et plicis paulo nitidulis; capite subtiliter asperulo-punctato, clypeo antice late sinuato, labro lato, leviter sinuato, antennis sat gracilibus, prothoracis basin haud attingentibus, articulis 4 ultimis brevioribus, paulo transversis, ultimo fere rotundato; prothorace valde transverso, elytris haud angustiore, lateribus antice rotundatis, postice leviter sinuatis, dorso densissime subtiliter strigosulo-punctato, margine postico ante angulos sinuato, his valde retroproductis; scutello lato, valde obtuso; elytris oratis, medio ampliatis, sutura elevata, utrinque nervis 4 sat regularibus, ramosis, intervallis clathratis, lateribus longitudinaliter plicatulis; subtus minus opaca, prosterno lateribus strigosulo, inter coxas conico-producto, pedibus sat gracilibus, tibiis rectis.*

Népal. — Musée de Genève et ma collection.

Voisin du *P. Frilingeni* par la sculpture des élytres, mais la réticulation est plus large, les élytres sont plus ovalaires, élargies en arrière, moins amples, n'ayant chacune que 2 nervures principales et le corselet est notablement plus étroit.

Pseudoblaps tenuestriata n. sp. — Long. 15 mill. — *Oblonga, modice convexa, nigra, parum nitida; capite brevi, subtilissime punctulato, antice sat late sinuato, sutura clypeali medio recta, utrinque obliquata, antennis parum gracilibus, prothoracis basin fere attingentibus, piceis, apicem versus rix sensim crassioribus, articulo 3^o sequenti parum longiore; prothorace transverso, elytris haud angustiore, lateribus sat fortiter rotundatis, basi breviter ac levissime sinuatis, dorso laevi, angulis anticis valde obtusis, basi fere recta, subtiliter (medio obsolete) marginata, ante angulos sinuata, his acute retroversis; scutello brevi, obtuso; elytris ad humeros angulatis, medio rix ampliatis, modice striatis, striis sat laevè modice punctatis, apice et lateribus profundioribus, intervallis laevibus, planiusculis, apice rix convexiusculis; subtus cum pedibus nitidior, laevis, abdomine basi medio obsolete strigosulo, tibiis*

anticis apice valde arcuatis et intus lobato-dilatatis, 4 posticis intus dense fulvo-pilosis, tarsis anticis dilatatis.

Ceylan : Trincomali (*Humbert*). — Musée de Genève et ma collection.

Bien distinct par les stries à peine marquées des élytres, les intervalles presque plans, unis, les angles postérieurs du corselet très pointus, les épaules finement angulées, les tibias antérieurs fortement arqués à l'extrémité et les postérieurs légèrement arqués, garnis en dedans d'une fine villosité.

Achthosus bihamatus n. sp. — Long. 48 mill. — Ressemble beaucoup à l'*A. furcicollis* Fairm., de Sumatra, mais un peu plus grand; la tête est aussi densément et rugueusement ponctuée, un peu plus concave, le bord antérieur se prolonge en un lobe relevé, tronqué, et les angles latéraux sont relevées en 2 saillies obtuses; le corselet est aussi armé de 2 cornes, mais plus longues, quoique ne dépassant pas la tête, un peu comprimées, carénées en dessus, arquées tout à fait à l'extrémité qui est tronquée; les angles postérieurs sont plus droits; les élytres sont un peu plus longues, fortement sillonnées et ces sillons fortement ponctués, crénelés, les intervalles convexes, lisses; le dessous, les pattes et les antennes sont d'un brun rougeâtre, les côtés du prosternum sont assez finement et lâchement ponctués, les métapleures sont rugueuses, l'abdomen est lisse avec une ligne fortement ponctuée à la base de chaque segment, le dernier ayant une ligne à peine marquée en demi-cercle, les tibias antérieurs sont fortement denticulés. La ♀ inerte, la tête rugueuse a 2 impressions transversales, le corselet est plus convexe, nullement impressionné en avant, les élytres sont plus convexes en longueur.

Bornéo : Pontianak. — Ma collection.

Artactes aeneipes n. sp. — Long. 40 mill. — Ressemble beaucoup au *nitidiceps* Fairm., du Tonkin, pour la forme et la taille; mais si la tête et le corselet sont d'un bronzé assez mat, les élytres sont d'un vert métallique assez brillant avec une étroite bordure marginale d'un doré plus brillant; le dessous du corps est d'un brun bleuâtre métallique avec les pattes d'un bleu verdâtre brillant à reflets dorés, les tibias surtout; la tête a une impression assez forte, un peu triangulaire, rétrécie au sommet, les points qui forment des lignes sur les élytres sont plus gros, l'écusson est de même couleur que les élytres.

Bornéo : Pontianak. — Ma collection.

Eucyrtus orichalceus n. sp. — Long. 46 mill. — *Oblongus, subel-*

lipticus, valde convexus, in elytrorum medio magis elevatus, fusculo-aeneus, nitidissimus, prothorace capiteque paulo purpurinis; capite laevi, vertice et fronte transversim sulcatis, hac brevissima, late leviter sinuata, epistomate brevissimo, transverso, labro simili, antennis basin prothoracis haud superantibus, fuscis, articulis 5 ultimis latioribus, transversis, ultimo fere rotundato; prothorace transverso, elytrorum basi vix angustiore, a basi antice angustato, lateribus leviter rotundato, margine antico arcuato, angulis rotundatis, dorso fere polito, basi leviter utrinque impressiuscula, subtiliter marginata, utrinque late sinuata, angulis sat acutis; scutello late ogivali; elytris ad humeros paulo angulatis, postice vix sensim ampliatis, subtiliter sed acute striatis, striis subtiliter punctulatis, cupreatis, intervallis planis, politis, margine externo anguste purpurino: subtus aeneus, cum pedibus cupreolis nitidissimus.

Bornéo : Pontianak. — Ma collection.

Remarquable par son corps très convexe au milieu des élytres, le corselet presque aussi large que les élytres, la surface très lisse et brillante, et les antennes presque claviformes. Ressemble à l'*E. trapezicollis* Fairm., en diffère par le corselet à côtés plus arrondis, légèrement sinués à la base, les élytres plus convexes, plus fortement striées.

Eucyrtus laticornis n. sp. — Long. 12 mill. — Ressemble assez au précédent pour la forme oblongue, non élargie en arrière, ni renflée sur les élytres, et par les antennes qui sont encore plus larges, les 6 derniers articles très transversaux, formant une massue allongée, dépassant un peu la base du corselet: la coloration est différente, très brillante, cuivreuse, mélangée de bleu sur le corselet, cette couleur formant, sur les élytres, des bandes alternées avec les cuivreuses, les 2 premières restant bleues, les autres mélangées, les intervalles très finement striolés-punctués, plans, mais les externes interrompus par des impressions oblongues (peut-être accidentelles?); le corselet a la même forme, mais moins arrondie au bord antérieur; le dessous du corps est d'un brun bronzé, les pattes sont rougeâtres avec les genoux et la base des tibias brunâtres.

Bornéo : Pontianak. — Ma collection.

N'ayant vu qu'un individu de cette espèce je ne puis affirmer que les impressions des interstries soient normales.

Eucyrtus viridans n. sp. — Long. 12 et 14 mill. — *Oblongus, modice convexus, coerulescenti-viridanus, nitidus, capite prothoraceque magis coeruleis; capite laevi, longiore, antennis fuscis, articulis ulti-*

mis opacis, latioribus; prothorace transverso, elytris angustiore, antice vix angustato, lateribus parum arcuatis, sat fortiter marginatis, dorso laevi, basi leviter et paulo arcuatim impresso, angulis posticis sat acuterectis, anticis fere rotundatis; scutello triangulari, obscuro; elytris oblongis, postice vix sensim ampliatis, sat tenuiter striatis, striis haud dense punctatis, lateribus et apice magis profundis, intercallis laevibus, dorso planis, lateribus et apice paulo convexiusculis; subtilis cum epipleuris pedibusque piceus, cage metallescens, tarsis anterioribus et ceteris minus sat dilatatis.

Célèbes (*Fruhstorfer*). — Ma collection.

Les tarses de cet insecte indiquent un passage aux *Platycrepis*, ils sont moins larges que chez ces derniers, mais plus larges que chez les vrais *Eucyrtus*. Sa forme très oblongue est assez remarquable.

Cryptobates crassecostatus n. sp. — Long. 15 mill. — *Elongatus, valde convexus, fuscus, cage aenescens, modice nitidus; capite rugoso-plicato, antice truncato, antennis validis, prothoracis medium superantibus, articulis 5 ultimis vix crassioribus sed paulo opaculis; prothorace latitudine haud latiore, elytrorum medio dimidio angustiore, lateribus sat, antice cum angulis rotundato, dorso sat fortiter rugoso-inaequali et grosse laxè punctato, basi truncata, subtiliter marginata, angulis fere obtusis; elytris ovalibus, medio ampliatis, basi paulo angustatis, humeris breviter acute angulatis, dorso valde convexis, punctulato-striatis, intervallis late parum fortiter costatis, levissime undulatis, postice et lateribus magis elevatis, apice fortiter declivibus; subtilis laevis, pedibus laevissimis, elongatis, prosterno medio sulcato, mesosterno vix obliquo, vix impresso.*

Ile Labouan. — Ma collection.

Cet insecte présente un faciès bien différent de l'espèce typique à raison de son aspect noir, brillant, et de ses élytres fortement sillonnées avec de larges intervalles convexes, mais je ne vois de différence un peu sérieuse au point de vue générique que dans la saillie prosternale qui est plus étroite et fortement sillonnée, le dernier article des palpes maxillaires moins fortement sécuriforme et les yeux plus convexes, plus dégagés en arrière.

Encyalesthus nitidipennis n. sp. — Long. 14 mill. — *Oblongus, convexus, postice vix ampliatus, fusculo-coeruleus, elytris aeneis, valde nitidus; capite laevi, sutura clypeali sat tenui sed valde arcuatim impressa, antennis prothoracis basin vix superantibus, fuscis, articulis 5 ultimis fere clavatis; prothorace valde transverso, elytris angustiore,*

lateribus antice tantum sat fortiter cum angulis rotundatis, dorso parce subtiliter punctato, basi marginato, utrinque late sinuato, angulis acutis; scutello triangulari, laevi: elytris basi rotundatis, ad humeros sat rotundatis, postice leviter ampliatis, fortiter punctato-striatis, intervallis convexiusculis, laevibus, postice magis convexis; subtus coerulescens, laevis, abdomine subtiliter strigosulo, pedibus coeruleis, femoribus paulo clavatis, anticis magis, tibiis anticis arcuatis, ceteris fere rectis.

Philippines : île Samar Mindanao . — Ma collection.

Ressemble au *brevicornis*, mais un peu plus grand, plus brillant, avec le corselet plus court, moins arrondi sur les côtés, et les stries plus visiblement ponctuées.

Toxicum Goliath n. sp. — Long. 27 mill. — *Elongatum, subparallelum, valde convexum, fuscum, subopacum; capite dense fortiter (antice subtilius) punctato, fronte lata, utrinque cornu parum elongato, valido, punctato armata; clypeo convexiusculo, antice late sinuato, sutura clypeali depressa, fere angulatim arruata, antennis validis, articulo 3^o quarto duplo longiore, clara apicali 4-articulata; prothorace quadrato, elytris sat angustiore, lateribus parallelis, antice tantum arcuatis, dorso modice punctato, medio longitudinaliter impresso, basi late bisinuato, paulo marginato, angulis acutis: scutello scutiformi: elytris parallelis, ad humeros oblique rotundatis, sat subtiliter punctatis, utrinque lineis 3 geminatis regulariter punctatis, spatio suturali sat lato, laevi, intervallo marginali apice convexo, margine ipso ante apicem levissime sinuato; subtus minus opacum, abdominis segmentis 2 ultimis nitidis, processu intercoxali sat acuto, prosterno inter coxas canaliculato, pedibus valde punctatis, punctis squamula minutissima ferruginea impletis.*

Bornéo : Pontianak. — Ma collection.

Cet insecte est le plus grand du genre, remarquable par les 2 seules cornes assez courtes, le corselet plus étroit et la saillie intercoxale assez acumérée.

Hoploedipus n. g.

Ce genre a pour type *Camarimena armipes* Fairm., qui diffère trop des vraies *Camarimena* pour rester dans ce genre.

Le rapprochement des yeux qui sont fortement saillants en dehors, moins fortement échancrés, les antennes plus grêles et grossissant peu à peu sans former une massue, les élytres plus allongées, nettement

épineuses à l'extrémité, non striées, les pattes antérieures très différentes par les fémurs renflés, armés en dessous d'une épine, les tibiais armés de même avec une bande de poils dans la moitié apicale, les tarses très velus, le 5^e article parfois plus long que les précédents réunis, justifient cette séparation générique. Quant à la pubescence serrée qui recouvre le dessous du corps, elle se retrouve aussi chez les *Camarimena*.

1. **H. bidentulus** n. sp. — Long. 16 mill. — *Elongatus*, antice et postice similiter angustatus, convexus, supra piceo-metallescens, ruge aeneomicans, elytris nitidissimis, capite prothoraceque subnitidis; capite dense punctato, inter oculos sulcato, antennis brevibus, nitidis, articulis 5 ultimis opaculis, pubescentibus, gradatim paulo crassioribus, ultimo majore; prothorace elytris angustiore, antice angustato, longitudine parum latiore, fortiter dense punctato, basi sat fortiter marginato, angulis paulo exsertis: scutello semirotundo, punctato; elytris elongatis, apice angustatis et utrinque spina brevi, acula terminatis, dorso subtiliter punctato-lineatis, punctis minutis, sed basi et lateribus sat grossis, cito decrescentibus, intervallis laevibus, stria suturali postice impressa et lineis 2 apice similiter impressis; subtus cum pedibus piceo-rufus, parum nitidus, fulvo-pubescent, pectore lateribus rugoso, tibiis anticis punctatis, paulo aenescentibus, femoribus omnibus politis.

Singapore (*Raffray*). — Ma collection.

Plus grand que l'*armipes*, en diffère par l'écusson non tronqué, les élytres rétrécies seulement à l'extrémité, non striées, les points formant à peine des lignes, les intervalles très lisses, l'extrémité épineuse sans être coupée obliquement.

2. **H. basicruralis** n. sp. — Long. 12 mill. — *Magis elongatus*, elytris aeneis, nitidis, capite prothoraceque rix nitidulis; his rugoso-punctatis, antennis basin prothoracis attingentibus, basi gracilibus, articulis 5 ultimis latioribus, opacis, 6^o quinto fere paulo crassiore; prothorace antice angustato: scutello semirotundo, laevi; elytris angustioribus, apice truncatis et spinula brevi terminatis, substriatulo-punctatis, puncti basi et lateribus majoribus, gradatim decrescentibus, intervallis laevibus, basi obsolete plicatulis, stria suturali profundiore, margine externo anguste coerulescente; subtus piceolo-aenescent, fulvo-pubescent, prosterno lateribus ruguloso, metapleuris concavis, subtiliter coriaceis; pedibus violaceis, purpurino tinctis, femoribus basi dense griseo-pubescentibus, apice politis, pedibus anticis similiter armatis.

Singapore (*Raffray*). — Ma collection.

Ressemble beaucoup à la description de l'*Armipes*, paraît plus petit, son écusson est arrondi, ses élytres ne sont rétrécies que vers l'extrémité qui est plutôt tronquée transversalement, les interstries sont lisses, les fémurs sont très lisses et la villosité des tibias antérieurs est fauve.

3. **H. heterodoxus** n. sp. — Long. 10 mill. — *Oblongus, brevior, longitudine magis convexus, aeneus, capite prothoraceque fortiter punctatis, parum nitidis et pilis griseis adpressis sat longis vestitis, elytris nudis, nitidis; oculis majoribus, vir sinuatis, antennis apice articulis 4 latioribus opacis terminatis; prothorace antice tantum angustato, medio linea longitudinali leviter impresso, basi minus marginata, angulis sat acutis, haud exsertis; scutello semiorotundato, bistriato; elytris brevius oblongis, ad humeros angulatis, post medium leviter ampliatis, postice angustatis et magis declivibus, apice truncatis et extus dente minutissimo armatis, dorso punctato-striatulis, punctis basi et lateribus majoribus, intercallis basi et saturum versus planiusculis, fere laevibus, extus et apice magis elevatis, subtiliter punctatis et asperulis, externis basi plicatulis et medio parapilosulis; subtus vir nitidulus, griseo-villosulus, segmentis ventralibus ad latera impressis, pedibus villosulis, femoribus anticis subtus vir angulatis et tibiis intus pilosis, medio dente minuto armatis.*

Singapore (*Raffray*). — Ma collection.

Cet insecte est intéressant comme dégénérescence; sauf la massue antennaire qui est large et rappelle plutôt celle des *Camarimena*, les autres caractères sont les diminutifs de ce qui existe chez les deux espèces précédentes; le corps est aussi bien plus court, plus élargi en arrière et plus convexe dans le sens de la longueur.

Pontianacus n. g.

Ce nouveau genre remplace, dans l'extrême Orient, les *Pyganisia* d'Amérique dont il ne diffère guère que par les yeux plus grands, assez rapprochés; comme chez *Plesiophthalmus* et *Amarygnus*, la suture clypéale fortement marquée, les antennes un peu plus épaisses, le 3^e article à peine plus long que le 4^e, l'écusson plus large, obtusément arrondi à l'extrémité, la saillie intercoxale plus obtuse, le 4^e segment égal au 3^e et les pattes un peu plus longues.

P. rubricrus n. sp. — Long. 13 mill. — *Oblongus, subellipticus, postice paulo magis attenuatus, valde convexus, ater, vir nitidulus, femoribus rubris, genibus exceptis; capite inter oculos rugosulo-punc-*

tato, clypeo tenuius, antennis nitidis; prothorace magis convexo, elytris vix angustiore, antice arcuatim angustato, margine postico late bisinuato, angulis acute rectis; elytris modice striatis, striis late punctatis, intercallis vix convexiusculis, apicem versus paulo magis elevatis, subtus cum pedibus nitidulus, femoribus tibiisque intus sat dense fulro-puberulis, pectore similiter ac breviter fulro-puberulo.

Bornéo : Pontianak. — Ma collection.

Enganodia n. g.

Corpus oblongum, sat convexum. Caput mediocre, antice truncatulum, oculi sat approximati, ectus angulato-producti, tuberculi antennarii elevati, antennae basi graciles (apice?), articulo 3^o longiore. Prothorax transversim quadratus, elytris angustior, lateribus sat tenuiter marginatis, fere parallelis, angulis posticis acutis. Scutello ogivale. Elytra oblonga, ad humeros rotundatim angulata, haud striata. Prosternum mediocre, inter coras impressum, apice angulato-carinatum, haud arcuatum, mesosternum angulatim impressum, processus intercoralis paulo obtuse ogivalis. Pedes sat graciles, modice elongati, tarsi subtus pilosulis, anticis articulo ultimo ceteris conjunctis fere longiore, metatarso elongato, 4^o aequali, ungibus mediocribus.

Je ne sais au juste où placer cet insecte; il a presque le faciès de certains *Poccilesthus*, mais ses yeux rapprochés, angulés en dehors, ses téguments peu robustes, l'en éloignent, et l'absence des derniers articles antennaires est fort gênante. Cependant je le classe provisoirement près des *Poccilesthus*.

E. sanguinicrus n. sp. — Long. 12 mill. — *Oblonga, convexa, virescens, vix nitidula, submetallescens, elytris rase fulrescentibus, subtus nitidior, pedibus coerulescentibus, femoribus sanguineis; capite punctulato, inter oculos plicatulo et sat fortiter impresso, clypeo subtiliter ac densius punctato; prothorace transversim subquadrato, antice vix sensim attenuato, lateribus rectis, ad angulos anticos tantum rotundatis, dorso dense rugosulo-punctato, basi picea, sat fortiter marginata, medio breviter sulcatula, sulco medio tenuiter carinulato; scutello late ogivali, punctulato; elytris oblongis, basi fere truncatis, postice vix sensim ampliatis, dorso subtiliter punctulato, substriatis, striis externis fortius punctatis, intercallis planis, basi transversim impressa et ad humeros breviter sulcatula; subtus laevis, lateribus paulo punctata, abdomine apice rufescente, processu intercorali oblongo-ogivali, subtiliter ruguloso.*

Iles Philippines : Engano. — Ma collection.

Synchroina n. g.

Ce nouveau genre, extrêmement voisin des *Synchroa* d'Amérique, n'en diffère guère que par le mésosternum concave avec les bords très relevés et avancés de chaque côté, recevant la saillie du prosternum : le dernier article des palpes maxillaires est tronqué très obliquement et le menton est plus étroit. La forme du corps est semblable, les élytres sont un peu plus atténuées en arrière et plus acuminées.

S. tenuipennis n. sp. — Long. 8 mill. — *Elongata, postice longe attenuata, castanea, nitida, sat dense fulvo-pilosula, subtilius cum pedibus magis picea; capite obtuso, conereo, sat dense subtiliter punctulato, antice denudato, antennis gracilibus, corporis medium fere attingentibus; prothorace transverso, elytris haud angustiore, antice paulo angustato, basi bisinuata, angulis acutis, dorso sat dense punctato, postice medio biforcato; scutello brevissimo, truncato; elytris elongatis, a medio at tenuatis, apice obtuse truncatulis, sat dense ariculato-punctulatis, basi leviter asperulis, stria suturali postice tantum impressa; subtilissime punctulata, pectoris lateribus fortius punctatis, pedibus gracilibus, tarsorum articulo 1^o ceteris conjunctis longiore.*

Sumatra : Perak. — Ma collection.

Il est intéressant de voir une forme américaine reproduite dans la Malaisie, comme on le voit dans le genre *Penthe*.

Chlorophila Davidi n. sp. — Long. 18 mill. — Cet insecte, qui a été rapporté du Moupin par M. l'abbé A. David, il y a longtemps, ressemble entièrement à celui que j'ai décrit sous le nom de *nitidicollis* et qui provient du Darjiling. Il présente la même coloration et ne diffère que par le corselet un peu plus court, avec les angles antérieurs moins marqués, et le bord postérieur à peine relevé, l'écusson d'un vert métallique brillant, les élytres plus longues, plus atténuées en arrière, mais moins acuminées à l'extrémité, leur coloration est légèrement bleuâtre, la bande marginale est également d'un jaune pâle, les stries sont à peine distinctes, la tête n'a pas une petite fossette entre les yeux, les antennes sont plus foncées; toute la poitrine est d'un vert métallique brillant, le prosternum est finement striolé, l'abdomen est très finement ponctué avec un reflet d'un vert métallique, le mésosternum est roux, comme toutes les hanches.

Moupin; communiqué par M. R. Oberthür.

Palimna mimica n. sp. — Long. 20 mill. — Forme et coloration de *P. Mouhoti*, mais avec les élytres plus courtes, ce qui les rend plus

atténuées en arrière, la couleur blanche couvre tout le haut de la tête, ne laissant, au milieu, qu'une petite tache noire transversale; le corselet présente aussi sur le disque 2 macules noires, mais moins limitées et ayant en avant 3 tubercules coniques, les 2 latéraux obtusément coniques, le médian, un peu en arrière, légèrement comprimé et plus saillant, 2 petites taches noires au bord antérieur, le reste parsemé de petites granulations noires, les angles latéraux plus robustes; l'écusson est blanc avec les côtés noirs, relevés en dent; les élytres ont les dessins presque semblables, mais très grêles, ne formant pas de taches ovalaires vers la suture, elles ont une légère teinte roussâtre autour de l'écusson et aux épaules, leur base est droite, non lobée, la petite crête près de l'écusson est aussi munie de 2 dents noires, mais plus séparées, moins inégales, les côtés sont granuleux à la base au lieu d'être ponctués. Le dessous et les pattes n'offrent pas de différences.

Cet intéressant insecte provient du Boutang et m'a été donné par notre collègue M. R. Oberthür.

